



用藥指導- Amoxicillin & Clavulanic acid

商品名：Augmentin syrup

中文名：安滅菌懸浮液(複方)

成分含量：Amoxicillin 400 毫克 / Clavulanic acid 57 毫克 / 5 c.c .
35 c.c/ 瓶

作用：感染症

用法與劑量

本藥品依醫師處方量使用，2 歲以下之兒童依體重調整劑量。

輕中度感染症

- ⊙ 2 ~ 6 歲：每日二次，每次 2.5 c.c
- ⊙ 7 ~ 12 歲：每日二次，每次 5 c.c

重度感染症

- ⊙ 2 ~ 6 歲：每日二次，每次 5 c.c
- ⊙ 7 ~ 12 歲：每日二次，每次 10 c.c

醫師/藥師指示服藥方式

每天	早餐	中餐	晚餐	睡前	特別指示
用量					

藥品存放方式

- ⊙ 乾粉製劑應放於密閉容器內，室溫下(15 ~ 30 °C)，避光貯存；配製後懸浮液應置於冰箱內(2 ~ 8 °C)貯存，並於 7 天內使用完畢。
- ⊙ 注意避免放在孩童容易取得的地方。
- ⊙ 使用前請先依配製方式來配製，懸浮液服用前請先振盪均勻。

3 February 2017



eDucating the community by
 sHaring the expertise of the Medical Faculty

continued

如果有下列任何不尋常症狀時，應儘快告知醫師/藥師：

蕁麻疹；發癢；皮膚發紅、腫脹、起泡或脫皮，而且有可能伴隨噁心、嘔吐、腹瀉、腸胃不適等。

注意事項

若您對此藥有任何疑慮，請聯絡醫師或藥師。

- Ⓢ 如果孩子忘記（錯過）一次用藥，一旦想起請儘早讓小孩服用錯過的藥物。
- Ⓢ 如已接近下一次用藥時間，則跳過錯過的那次用藥量，隨後回到的正常用藥時間。
- Ⓢ 避免同時服用 2 劑或額外劑量。
- Ⓢ 請勿將藥分給其他小孩吃。
- Ⓢ 看診時請隨身攜帶一份藥物的清單（處方藥、健康食品、維他命製劑、非處方藥）給醫師。
- Ⓢ 嚴格遵照醫師指示讓孩子按時定量服藥，在未徵詢醫師同意前，請勿擅自決定開始、停止服用任何藥物或變更藥物劑量。

兒童用藥紀錄表

時間點	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
早上							
中午							
晚上							
睡前							

本單張無法詳載完整藥品資訊，若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡。

106.01 HE-CP003

中國醫藥大學兒童醫院

聯絡電話 (04) 22052121 分機 3154 / 5126

若有任何疑問，歡迎您與我們聯絡